



バラシクロビル粒状錠を服用するときの注意

① かまずに水でお飲みください。

(本剤は成分の苦みを防ぐため、コーティングをしています。)

② 開封するときは、切り口を上にして 静かに開けてください。

(中のお薬が飛び散らないように注意してください。)



③ お薬は手に移さないで 直接袋から口に 入れてください。



④ 飲み残しがないようにしてください。

⑤ 1回に2包飲むよう指示されているときは、 2包まとめて飲まずに1包ずつ飲んでください。

⑥ お薬を水に 混ぜないでください。



バラシクロビル粒状錠を服用される方へ

中面も
必ずお読み
ください

かまずに水で お飲みください



原寸大

開封後すみやかに飲みください。

このお薬は飲みやすくするために
水分で表面にとろみがつく性質があります。


※ご不明な点は、医師または薬剤師にお尋ねください。



腎臓の働きは低下していませんか？

以下に該当する場合は、このお薬を服用する前に、
医師・薬剤師にお知らせください。

- 透析を受けている。
- 腎臓がわるい
と言われたことがある。
- むくみがある。
- 尿がでない、または量が少ない。



以下のような症状がみられた場合は、
**服用をやめて、すぐに、医師・薬剤師
にご相談ください。**

- めまい
- ふらつき
- だるい
- 頭痛
- ぼーっとして意識が薄れる
- むくみ
- 眼がはれぼったい
- 尿量が減る

POINT!

**服用中は、水分を
十分に補給してください。**

脱水状態になると副作用がでやすくなるので、本剤を服用中は普段より水分を多めに取ってください。

